

كيفية التحضير لاختبار الكبسولة السالكية

ماذا يحدث بعد أن يتلع طفلي الكبسولة السالكية؟

سنعطيك قبة مرضاض وقفازات. يجب أن يتغوط طفلك بقبة المرضاض، ويجب أن تبحث عن الكبسولة في البراز.

إذا لم تر الكبسولة بعد مرور ٣٠ ساعة على ابتلاعها، فسيحتاج طفلك إلى أشعة سينية على الفور. وذلك لأنه بعد ٣٠ ساعة تبدأ الكبسولة في الذوبان، وعلينا أن نرى أين توجد في الجسم.

متى يمكن لطفلي تناول الطعام والشراب مجدداً؟

- بعد ساعتين من ابتلاع الكبسولة: يمكن لطفلك أن يشرب السوائل.
- بعد ٤ ساعات من ابتلاع الكبسولة: يمكن لطفلك تناول وجبة خفيفة.
- بعد ٨ ساعات من ابتلاع الكبسولة: يمكن لطفلك معاودة نظامه الغذائي المعتمد.

متى يجب أن أتصل بفريق الرعاية الخاص بطفلي؟

اتصل بمكتب طبيبك على الفور إذا كان طفلك يعاني من:

- ألم شديد في البطن
- الغثيان (الاحساس بالمرض في المعدة)
- القيء (التقيؤ)

اتصل بنا

بوسطن: 617-355-6172، الخيار ٣، ٧ صباحاً - ٤ بعد الظهر.
لأوقات الإجراء وأوقات الوصول، 617-355-6172، الخيار ١،
١٢ ظهراً - ٣ بعد الظهر.

ليكسينغتون: 781-216-3000، ٧ صباحاً - ٤ بعد الظهر.

والتهام: 781-216-1285، ٨ صباحاً - ٥ بعد الظهر.

تشرح هذه الورقة التعليمية كيفية التحضير لاختبار الكبسولة السالكية وما يجب القيام به بعد ذلك.

ما هو اختبار الكبسولة السالكية؟

أثناء هذا الاختبار، يتلع طفلك حبة كبيرة تسمى "الكبسولة السالكية" (انظر الشكل ١). يساعدنا هذا الاختبار على معرفة ما إذا كان جسم ما بحجم الكبسولة يمكنه المرور عبر أمعاء طفلك.

- إذا عبرت الكبسولة عبر جسم طفلك قبل أن تذوب (وتجدها في البراز)، فهذا يعني أن معدته وأمعائه واسعة بما يكفي لتمرير جسم ما بحجم كبسولة.
- وإذا كانت الكبسولة لا تزال داخل جسم طفلك بعد ٣٠ ساعة، فإنها تذوب إلى قطع صغيرة وتمر عبر أمعائه بمفردها.



الشكل ١

كيف يجري اختبار الكبسولة السالكية؟

- يتلع طفلك الكبسولة.
- في اليوم التالي - أو بعد مرور ٣٠ ساعة على ابتلاع الكبسولة - قد يعود طفلك لإجراء الأشعة السينية إذا كانت الكبسولة لا تزال داخل جسمه.
- يناقش فريق الرعاية الصحية الخاص بطفلك النتائج والخطوات التالية معك. إذا كانت الكبسولة لا تزال في الجسم، فقد يوصي فريق الرعاية باختبارات إضافية.

كيف أحضر طفلي لاختبار الكبسولة السالكية؟

مهم: يرجى إعلام فريق الرعاية الخاص بك ما إذا كان طفلك يعاني من حساسية الحليب أو حساسية الباربيوم. سيعلمونك ما إذا كان هذا الاختبار آمناً لطفلك.

أسبوع قبل إختبار الكبسولة السالكية:

- لا يمكن لطفلك أن يتناول أي منتجات تحتوي على الباربيوم. تحدث مع فريق الرعاية إذا كانت لديك أسئلة حول المنتجات التي قد تحتوي على الباربيوم.

في يوم اختبار الكبسولة السالكية:

- ما لم يتم توجيهك خلاف ذلك، تناول الأدوية اليومية العادية بعد تناول الكبسولة السالكية.
- ٨ ساعات قبل الإجراء: يستطيع طفلك فقط شرب الماء وعصير التفاح والبيديلايت الشفاف حتى قبل ٣ ساعات من الإجراء.
 - لا يسمح بتناول الأطعمة الصلبة وحليب الأطفال، والبوريه، والحلوى الصلبة، والحليب أو العلكة.
 - يُعتبر أي مئخن للوجبات، بما في ذلك حليب الأطفال مع الأرز المضاف، أو سمبلي ثك (SimplyThick) أو ثك إيت (Thick-It)، مادة صلبة ويجب إيقافها قبل ٨ ساعات من الإجراء.
- ٣ ساعات قبل الإجراء: لا ينبغي أن يأكل أو يشرب طفلك أي شيء.