



Este folheto informativo para a família explica como se preparar para um exame com cápsula de patência e o que fazer depois disso.

O que é o exame com cápsula de patência?

Durante esse exame, a criança engole uma pílula grande chamada "cápsula de patência" (vide Figura 1). Esse exame nos ajuda a ver se um objeto do tamanho dessa cápsula consegue passar pelo intestino de seu filho/sua filha.

- **Se a cápsula passar pelo corpo da criança antes de se dissolver** (e você encontrá-la nas fezes da criança), significa que o estômago e o intestino da criança são largos o suficiente para que um objeto desse tamanho passe por eles.
- **Se a cápsula ainda estiver no corpo da criança depois de 30 horas**, ela se dissolverá em pedaços pequenos e passará pelo intestino sozinha.



Figura 1

Como funciona o exame com cápsula de patência?

- A criança engole a cápsula.
- No dia seguinte, ou até 30 horas depois de engolir a cápsula, a criança pode retornar para uma radiografia se a cápsula ainda não tiver sido expelida.
- A equipe médica de seu filho/sua filha discutirá os resultados e próximas etapas com você. Se a cápsula ainda estiver dentro do corpo, a equipe médica pode recomendar outros exames.

Como preparo meu filho/minha filha para o exame com cápsula de patência?

Importante: Informe a equipe se a criança tiver alergia ao leite ou bário. Eles lhe dirão se o exame é seguro para seu filho/sua filha.

1 semana antes do exame de cápsula de patência

- A criança não pode ingerir nenhum produto com bário. Converse com a equipe médica se tiver dúvidas sobre quais produtos podem ter bário em sua composição.

Dia do exame com cápsula de patência

- Exceto em caso de instrução contrária, a criança pode tomar os medicamentos diários de uso regular **depois** da cápsula de patência.

- **8 horas antes do procedimento:** A criança pode ingerir somente água, suco de maçã e Pedialyte® transparente até **3 horas antes do procedimento.**
 - É proibido comer alimentos sólidos, purês, balas duras, leite ou chiclete.
 - Todo espessante alimentar, incluindo fórmula com arroz, SimplyThick® ou Thick-It®, é considerado um sólido e deve ser interrompido 8 horas antes do procedimento.
- **3 horas antes do procedimento: A criança deve parar de comer e beber.**

O que acontece depois que meu filho/minha filha engole a cápsula de patência?

Vamos lhe entregar um coletor sanitário com suporte e um par de luvas. A criança deve defecar no coletor e você deve procurar a cápsula nas fezes.

Caso não veja a cápsula nas 30 horas seguintes à sua ingestão, a criança terá que passar imediatamente por uma radiografia. Faremos isso porque, após 30 horas, a cápsula começa a se dissolver e nós precisamos saber em que ponto do corpo da criança ela está.

Quando meu filho/minha filha poderá voltar a comer e beber?

- **2 horas depois de engolir a cápsula:** A criança pode beber líquidos.
- **4 horas depois de engolir a cápsula:** A criança pode fazer uma refeição leve.
- **8 horas depois de engolir a cápsula:** A criança pode voltar à alimentação normal.

Quando devo ligar para a equipe médica de meu filho/minha filha?

Entre em contato com o médico imediatamente se a criança tiver:

- Muita dor abdominal (dor de barriga)
- Náusea (enjoo de estômago)
- Vômitos

Fale conosco

Boston: 617-355-6172, opção 3, das 7h às 16h.
Para horários de chegada e procedimento:
617-355-6172, opção 1, das 12h às 15h.

Lexington: 781-216-3000, das 7h às 16h.

Waltham: 781-216-1285, das 8h às 17h.