



Esta hoja informativa para familias explica cómo prepararse para una prueba con cápsula de permeabilidad y qué se debe hacer después.

¿Qué es la prueba con cápsula de permeabilidad?

Durante esta prueba, el niño tragará una pastilla grande llamada "cápsula de permeabilidad" (Figura 1). La prueba nos ayuda a ver si un objeto del tamaño de la cápsula puede pasar por el intestino de su niño.

- **Si la cápsula pasa por el cuerpo del niño antes de disolverse** (y usted la encuentra en la materia fecal), eso quiere decir que el estómago y el intestino del niño son lo suficientemente anchos para permitir que pase un objeto del tamaño de la cápsula.
- **Si después de 30 horas sigue dentro del cuerpo del niño**, se disolverá en pedacitos y saldrá sola por el intestino.



Figura 1

¿Cómo funciona la prueba de la cápsula de permeabilidad?

- El niño traga la cápsula.
- Al día siguiente, o hasta 30 horas después de tragarla, si la cápsula sigue dentro de su cuerpo deberá regresar para que le tomen una radiografía.
- El equipo de salud analizará los resultados y hablará con usted de los próximos pasos. Si la cápsula sigue dentro del cuerpo, el equipo podría recomendarle otras pruebas.

¿Cómo preparo al niño para la prueba con cápsula de permeabilidad?

Importante: informe al equipo si el niño tiene una alergia conocida a la leche o al bario. Ellos le dirán si la prueba es segura para el niño.

1 semana antes de la prueba de permeabilidad

- El niño no puede consumir productos con bario. Hable con el equipo de cuidados si tiene preguntas sobre qué productos contienen bario.

El día de la prueba de permeabilidad

- A menos que le indiquen otra cosa, tome los medicamentos habituales **después** de tragar la cápsula.

- **8 horas antes del procedimiento:** su niño sólo puede tomar agua, jugo de manzana y Pedialyte® transparente hasta 3 horas antes del procedimiento.
 - No se permiten alimentos sólidos, leche de fórmula, purés, caramelos duros, leche o chicle.
 - Todos los espesantes para alimentos, incluso las fórmulas con arroz añadido, como SimplyThick® o Thick-It®, se consideran un alimento sólido y se deben parar a la medianoche del día antes del procedimiento.
- **3 horas antes del procedimiento: su niño no debe comer ni beber nada.**

¿Qué pasa después de que el niño trague la cápsula?

Le daremos un adaptador para recoger materia fecal del inodoro, y guantes. El niño debe evacuar en el adaptador y usted debe revisar la materia fecal para buscar la cápsula.

Si no ve la cápsula 30 horas después de tragarla, habrá que hacerle una radiografía de inmediato. Esto es porque al cabo de 30 horas, la cápsula empieza a diluirse y tenemos que ver en qué parte del cuerpo está.

¿Cuándo podrá volver a comer y beber mi niño?

- **2 horas después de tragar la cápsula:** el niño puede tomar líquidos.
- **4 horas después de tragar la cápsula:** el niño puede comer algo ligero.
- **8 horas después de tragar la cápsula:** el niño puede reanudar su dieta habitual.

¿Cuándo debo llamar al equipo de cuidados de mi niño?

Comuníquese de inmediato con el consultorio de su médico si el niño tiene:

- Dolor abdominal (de barriga) intenso
- Náuseas (ganas de vomitar)
- Vómitos

Comuníquese con nosotros

Boston: 617-355-6172, opción 3, de 7 a.m. a 4 p.m.
Para horarios de llegada a los procedimientos, 617-355-6172, opción 1, de 12 p.m. a 3 p.m.

Lexington: (781) 216-3000, de 7 a. m. a 4 p. m.

Waltham: (781) 216-1285, de 8 a. m. a 5 p. m.